

POST-OP

Informacje i wskazówki pooperacyjne

Przed powrotem do domu pragniemy udzielić ostatnich wskazówek.

Prosimy pamiętać: mimo, iż leki, które zostały użyte podczas znieczulenia wywołują tylko krótki sen, to może Pan/Pani/dziecko być pod ich dyskretnym działaniem jeszcze jakiś czas, dopóki nie zostaną wydalone z organizmu. Mogą one np. pogorszyć refleks, zmniejszyć zdolność koncentracji uwagi czy powodować przejściowe zawroty głowy.

Radzimy więc by przez najbliższe 24 godziny:

- nie pić alkoholu
- nie brać proszków nasennych
- nie prowadzić samochodu ani nie jeździć na rowerze
- nie używać skomplikowanych urządzeń mechanicznych
- nie wychodzić na ulicę bez asysty osoby dorosłej
- nie podejmować ważnych decyzji życiowych
- nie podpisywać żadnych dokumentów mogących mieć skutek prawny
- nie robić niczego, co mogłoby być niebezpieczne dla Pana/Pani lub otoczenia

Po operacji może boleć. **W celu zmniejszenia bólu przepisany został lek:**

1.

2.

3.

Może Pan/Pani/dziecko jeść i pić od godziny o ile nie wystąpią nudności lub wymioty.

Pacjenci czasami doświadczają po znieczuleniu pewnych przejściowych dolegliwości, np.:

- utrata apetytu
- uczucie ogólnego zmęczenia
- zawroty głowy
- ból głowy
- nudności/wymioty
- ból gardła
- bóle w mięśniach
- bolesność przy uciskaniu miejsca zastrzyków

Dolegliwości te są zwykle niezbyt nasilone i mijają po 1-2 dniach. W przypadku pogorszenia samopoczucia, krwawienia, nudności/wymiotów lub jakichkolwiek niepokojących Pana/Panią objawów prosimy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

POST-OP

Informacje i wskazówki pooperacyjne

Przed powrotem do domu pragniemy udzielić ostatnich wskazówek.

Prosimy pamiętać: mimo, iż leki, które zostały użyte podczas znieczulenia wywołują tylko krótki sen, to może Pan/Pani/dziecko być pod ich dyskretnym działaniem jeszcze jakiś czas, dopóki nie zostaną wydalone z organizmu. Mogą one np. pogorszyć refleks, zmniejszyć zdolność koncentracji uwagi czy powodować przejściowe zawroty głowy.

Radzimy więc by przez najbliższe 24 godziny:

- nie pić alkoholu
- nie brać proszków nasennych
- nie prowadzić samochodu ani nie jeździć na rowerze
- nie używać skomplikowanych urządzeń mechanicznych
- nie wychodzić na ulicę bez asysty osoby dorosłej
- nie podejmować ważnych decyzji życiowych
- nie podpisywać żadnych dokumentów mogących mieć skutek prawny
- nie robić niczego, co mogłoby być niebezpieczne dla Pana/Pani lub otoczenia

Po operacji może boleć. **W celu zmniejszenia bólu przepisany został lek:**

1.

2.

3.

Może Pan/Pani/dziecko jeść i pić od godziny o ile nie wystąpią nudności lub wymioty.

Pacjenci czasami doświadczają po znieczuleniu pewnych przejściowych dolegliwości, np.:

- utrata apetytu
- uczucie ogólnego zmęczenia
- zawroty głowy
- ból głowy
- nudności/wymioty
- ból gardła
- bóle w mięśniach
- bolesność przy uciskaniu miejsca zastrzyków

Dolegliwości te są zwykle niezbyt nasilone i mijają po 1-2 dniach. W przypadku pogorszenia samopoczucia, krwawienia, nudności/wymiotów lub jakichkolwiek niepokojących Pana/Panią objawów prosimy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.